

正誤表

「平成25年度後期 登録販売者資質向上研修【集合研修 後期用テキスト】」について、以下の通り訂正がございました。お詫びして訂正させていただきます。

該当箇所	誤	正
81頁、下から6行目	・大量または頻回購入(1回に80日分以上の購入)を希望するものに対し、購入理由を確認すること	・大量購入は概ね1回の購入量が60日分以上、頻回購入は概ね7日以内の購入量総数が60日分以上希望するものに対し、購入理由を確認すること
99 頁、表、注意事項欄2段目	テトラサイクリン系抗生物質、ニューキノロン系抗菌薬、ビスホスホネート系薬剤(骨粗鬆症治療薬)と同時服用するとこれらの腸管吸収を抑制するので、2時間以上の間隔を空けて服用する。	テトラサイクリン系抗生物質、ニューキノロン系抗菌薬、ビスホスホネート系薬剤(骨粗鬆症治療薬)と同時服用するとこれらの腸管吸収を抑制するので、 <u>テトラサイクリン系抗生物質、ニューキノロン系抗菌薬は2時間以上、ビスホスホネート系薬剤は30分以上間隔を空けて服用する。</u>
124頁、冒頭	これらの医薬品と、ミネラルを含む他の医薬品・サプリメントなどを併用したい場合は、同時に摂取することは避け、2時間ぐらい間隔を開けて摂るよう伝えます。	これらの医薬品と、ミネラルを含む他の医薬品・サプリメントなどを併用したい場合は、同時に摂取することは避け、 <u>テトラサイクリン系抗生物質は2時間以上、ビスホスホネート系薬剤は30分以上間隔を空けて摂るよう伝えましょう。</u>
160頁、右下「小腸の構造と役割(空腸、回腸)」	・回腸には、免疫を制御する <u>バイエル</u> 板が存在する。	・回腸には、免疫を制御する <u>パイエル</u> 板が存在する。