

平成 29 年度前期 集合研修テキスト訂正のお知らせ

テキスト訂正（本テキスト内にて、以下の誤りがありました。訂正して深くお詫び申し上げます。）

正誤箇所	誤	正								
81 頁 Q3 174 頁左列上	眼精疲労の対応については、単に 眼精疲労 が適応にある点眼薬を勧めればよいというのではなく、～	眼精疲労の対応については、単に 眼の疲れ が適応にある点眼薬を勧めればよいというのではなく、～								
99 頁 Q14 186 頁右列下	開封後はこの使用期限によらず、 1～2ヶ月 を目途に速やかに使い切るように勧めます。一般的に目薬の一滴を 50 μg 程度として換算すると	開封後はこの使用期限によらず、 3ヶ月 を目途に速やかに使い切るように勧めます。一般的に目薬の一滴を 50 μL 程度として換算すると								
107 頁 A24 8行目	消費庁 によって調べられた	消費者庁 によって調べられた								
126 頁 柴胡桂枝湯 206 頁 右列中央	体質のポイント ・ 体力充実～中等度	体質のポイント ・ 体力中等度～虚弱								
129 頁「参蘇飲」 208 頁 左列上	構成生薬 人参（にんじん）茯苓（ぶくりょう）半夏（はんげ）陳皮（ちんぴ）葛根（かっこん）桔梗（ききょう）枳実（きじつ）蘇葉（そよう）前胡（ぜんこ）生姜（しょうきょう）	構成生薬 人参（にんじん）茯苓（ぶくりょう）半夏（はんげ）陳皮（ちんぴ）葛根（かっこん）桔梗（ききょう）枳実（きじつ）蘇葉（そよう）前胡（ぜんこ）生姜（しょうきょう） 甘草（かんぞう）大棗（たいそう）								
130 頁 表組 209 頁左列上 表組 212 頁左列中 表組 小青竜湯・辛夷清肺湯	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">体力がある場合 (体力充実～中等度)</td> <td style="text-align: center;">小青竜湯 葛根湯加川芎辛夷</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">体力がない場合 (体力中等度～虚弱)</td> <td style="text-align: center;">辛夷清肺湯</td> </tr> </table>	体力がある場合 (体力充実～中等度)	小青竜湯 葛根湯加川芎辛夷	体力がない場合 (体力中等度～虚弱)	辛夷清肺湯	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">体力がない場合 (体力中等度～虚弱)</td> <td style="text-align: center;">小青竜湯</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">体力がある場合 (体力充実～中等度)</td> <td style="text-align: center;">葛根湯加川芎辛夷 辛夷清肺湯</td> </tr> </table>	体力がない場合 (体力中等度～虚弱)	小青竜湯	体力がある場合 (体力充実～中等度)	葛根湯加川芎辛夷 辛夷清肺湯
体力がある場合 (体力充実～中等度)	小青竜湯 葛根湯加川芎辛夷									
体力がない場合 (体力中等度～虚弱)	辛夷清肺湯									
体力がない場合 (体力中等度～虚弱)	小青竜湯									
体力がある場合 (体力充実～中等度)	葛根湯加川芎辛夷 辛夷清肺湯									
134 頁 最下段 212 頁 左列上	主要成分：含水 乳酸 カルシウム	主要成分：含水 硫酸 カルシウム								
140 頁 下 重大な副作用D	肝機能障害、黄疸：AST (GOT)、ALT (GPT)、 Al-P、γ-GTP	肝機能障害、黄疸：AST (GOT)、ALT (GPT)、 ALP、GGT (γ-GTP)								
204 頁右列上	香附子 (こぶうし) とは	香附子 (こうぶし) とは								

一般社団法人 日本薬業研修センター
(2017.6.19)